

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Pada penelitian ini didapatkan hasil penatalaksanaan atresia ani dengan metode *posterosagittal anorectoplasty* adalah sangat baik dan baik pada 73% pasien, cukup pada 27% pasien.
2. Komplikasi pasca operasi yang terjadi adalah relatif jarang, berupa stenosis ani, obstruksi pascaoperasi, fistula rektovestibuler residif, dan dehisensi luka operasi.
3. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara skor Klotz dengan jenis kelamin, umur saat PSARP, ketinggian lesi, dan jenis operasi. Terdapat hubungan yang bermakna antara skor Klotz dengan ada tidaknya fistula.

5.2. Saran

Penelitian ini dilakukan selama sepuluh tahun sepuluh bulan, dengan harapan mendapatkan jumlah sampel yang cukup besar sehingga antara variabel-variabelnya dapat dilakukan analisis statistik untuk mencari hubungan diantara variabel-variabel tersebut. Pada penelitian ini, hasil uji statistik kebanyakan menunjukkan tidak adanya hubungan bermakna antara variabel yang secara teoritis seharusnya terdapat hubungan yang bermakna. Hasil ini mungkin memang demikian adanya, atau adanya bias yang disebabkan adanya *confounding factor* yang belum dikendalikan pada penelitian ini. Untuk itu diperlukan penelitian lanjutan yang idealnya dapat mengontrol *confounding factor* tersebut, yang tentunya akan lebih baik dan lebih mudah apabila penelitiannya bersifat prospektif.